

Szabadgyökerű gyümölcsfák: 4990 Ft/db

ALMA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Porzói	Bővebb leírás
GOLDEN REINDERS	szeptember - október	nagyméretű, az alapfajtánál nagyobb (150-180 g)	Héja vékony, enyhén viaszos, előbb zöldessárga, majd aranyárga színű . Húsa roppanó, lédús, kellemesen édeskés, aromás, jellegzetes illatú.	GALA, GLOSTER, IDARED	Kifejlett magasság: 3-4 m Sor- és tőtávolság: 5x4 m.Fény- és hőigény: nagy és közepes. Vízigény: nagy Fája közepesen erős növekedési erélyű. A talajhoz jól alkalmazkodik, laza, homoktalajon is megél .
HÚSVÉTI ROZMARING	október eleje	Középnagy (120-130g)	Gyümölcse kissé megnyúlt közép nagy, zöldessárga napos oldalán halvány piros. Vastag héja erősen viaszos. Húsa kemény, lédús, enyhén savanykás.	ÖNTERMÉKENY	Régi magyar télialma fajta. Fája erős növekedésű, gömb alakú koronát nevel. Késő fordul termőre, bőven de szakaszosan terem. Igénytelen betegségekre ellenálló. Nem válogat a talajtípusok között, a kötött és a homoktalajon egyaránt megél , a savanyú és meszes talajokon is jól fejlődik.
IDARED	október	Közepes-nagy (170-200g)	Élénkpiros héj , Fehéressárga hús, nagyon lédús, édes-savanykás	GLOSTER, GOLDEN REINDERS, JONATHAN, STARKING	Termőképessége kiváló, a Jonathan-ét meghaladja. Kevésbé fogékony a lisztharmatra, a venturiás varasodással szembeni fogékonysága mérsékelt. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető. Alkalmas pollenadó, porzó fák: Fiesta, Gloster, Jonathan, Golden Delicious, Golden klónok, Julired, Starking, Maigold
JONATHAN M41	szeptember eleje	közepes méretűek (120-130 g), vékony héjúak, tűzpirosra	A nagyon finom, harmonikus ízvilág, kellemesen édes-savanykás íz, és piros színű termésük	'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Idared', 'Starking', 'Téli arany parmen'.	Óriási előnye, hogy korán termőre fordul, rendszeresen, és évente bőséges termést hoz, viszont az alapfajtánál kisebb térigényű. Pollenadói: 'Starking', 'Golden Delicious', 'Idared'
MOLLIS DELICIOUS	augusztus - szeptember	nagy méretű (200-250 g)	Héja vastag , viaszos, színe zöldessárga, melyet nagyrészt világospiros, csíkozott fedőszín tarkít. Húsa közepesen kemény, ropogós, sárgásfehér , kellemesen fűszeres zamatú, íze a Starkingéra emlékeztető.	ÉVA, SUMMERRED, VISTA BELLA	Kifejlett magasság: 3-4 m. Sor- és tőtávolság: 5x4 m. Fája középerős vagy erős növekedési erélyű, koronája fiatalon felfelé törekvő, nehezen elágazódó, később szétterülő. Korán termőre fordul és megbízhatóan terem. Önmeddő.
SAMPION - BIO	szeptember közepe	Középnagy (120-130g)	közepes vagy nagy méretű, hordó alakú, sima héjú, zöldessárga alapszínű, kárminpiros fedőszínnel, sárgás húsu, omlós, harmonikusan édes-savas.	részben önporzó, IDARED	Középerős növekedésű, közepesen sűrű ágrend-szerrel. Korán termőre fordul, és rendszeresen és bőven terem.
STARKING DELICIOUS	szeptember második felétől október első feléig	nagyméretű (150-170 g),	Héja közepesen vastag, enyhén viaszos, kárminpiros, a fedőszín csíkokban, sávokban borítja. Húsa kemény, ropogós, sárgásfehér, édes, illatos, jellegzetesen fűszeres, alacsony savtartalmú.	'Gala', 'Golden Delicious', 'Idared', 'Jonathan'.	Fája közepesen erős vagy erős növekedési erélyű, mereven felfelé törő ágrendszerű. Bár termőre fordulásától növekedése mérséklődik, terebélyes, középsűrű koronát nevel.Gyenge metszést igényel. Termőképesség: későn fordul termőre, de onnantól bőven terem, bár kisebb mértékű alternanciára hajlamos. Önmeddő, ugyanakkor más fajták számára jó pollenadó.

Körte vk	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
BOSC KOBAK	Szeptember	nagy (180-200g)	A termeshéj közepesen vastag, alapszíne zöldessárga, de szinte teljesen barnás parával fedett, emiatt kissé érdes, száraz tapintású. A gyümölcshús hófehér, olvadó, lédús.	Clapp kedveltje, Serres Olivér, Vilmos és Kieffer körte.	Fája középerős növekedésű, koronája ritkás, felfelé törő, nagyon igényli a rendszeres metszést. Középkésőn fordul termőre, rendszeresen és bőven terem. Igénytelen, alkalmazkodóképes fajta, a talajban nem válogat, nagyon jól tűri a szelet és a téli fagyokat. A gombás betegségekre közepesen fogékony. Magasság: 5-8 m.
CLAPP KEDVELTJE	Augusztus eleje	nagy (180-200g)	A gyümölcshéj éretten szalmasárga, napos oldalon pirossal fedett, középvastag, gyengén viaszos. Húsa fehér, olvadó, bőlevű, nagyon ízletes, aromás.	Bosc kobak, Clairgeau vajkörte, Hardenpont, Vilmos körte.	Erős növekedésű, eleinte felálló ágrendszerű, később szétterülő gömb koronát nevel. Jól tűri hazánk szélsőséges téli hőmérséklet ingadozását. Középkorán fordul termőre, közepes termőképességű. Jó víz és tápanyagellátottságú talajokra ajánlott. Magasság: 5-8 m.
KIEFFER - BIO REZISZTENS KÖRTE	szeptember közepe	közepes vagy nagyméretű	Héja vastag, érdes, sárga, a Nap érte oldalán pirossal mosott, sűrűn pontozott. Húsa sárgásfehér, kemény, a magház körül kövecses, lédús, kellemesen fanyar ízű, birsre emlékeztető illatú. Friss fogyasztásra, konyhai feldolgozásra (befőtt), tárolásra (2-3 hónap) egyaránt alkalmas.	'Avranchesi jó Lujza', 'Bosc Kobak', 'Hardy vajkörte', 'Serres Oliver'.	Fája középerős vagy erős növekedésű, fiatal korban felfelé törekvő, idősebb korban enyhén lecsüngő és ritka. Vesszeje sárgásbarna. Levele nagy, széles, tojásdad, jellegzetesen csúcsosodó. Magasság: 4-5 m Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Nem öntermékeny, ezért pollenadó telepítése szükséges.
PACKHAMS TRIUM. REZISZTENS KÖRTE	szeptember közepe-vége	igen nagyméretű (200-270 g)	Héja középvastag, fényes, kezdetben zöld, rücskös, egyenetlen felületű, értével kisimul, sárga színű lesz, a csésze körül enyhén parás. Húsa fehér, olvadó, lédús, a 'Vilmos' körtéhez hasonló ízű és zamatú, nem szottyósodik és kevés kősejtet tartalmaz.	'Bosc kobak', 'Conference', 'Dr. Guyot Gyula', 'Vilmos'.	Fája középerős vagy erős növekedésű, mérsékelt felfelé törő, termőkorban ívesen lehajló, ritka ágrendszerű, gömb alakú koronát nevel. Középkorán fordul termőre, rendszeresen, kiegyenlített és igen bőven terem. Alternanciára alig hajlamos. Önmeddő. Jó pollenadó a középídőben virágzó fajtáknak. Kifejlett magasság: 5-8 m
HOSUI REZISZTENSJAPÁN KÖRTE	augusztus 3-4. hete	középnagy (150-200 g),	Gyümölcse kerekded, inkább almához hasonló, íze az ananászra, sárgadinnyére, birsre hasonlít, nem igényel utóérlelést, mivel már a fán beérik. Húsa fehér, olvadó, lédús, kövecses, enyhén savanykás, ízanyagiban muskotályos aromát is felfedezhetünk, az egyik legfinomabb fajta.	'Nijjisseiki', 'Shinseiki', 'Vilmos'.	Általános: a japán körte vagy más neveken ázsiai körte, vízikörte, koreai körte, almakörte, homokkörte hazánkban még kevésbé ismert és ültetett, pedig klímánk tökéletesen megfelel a termesztéséhez. A fagyokkal szemben ellenálló. Bár körte, alakjában, ízében, érési idejében is eltér az általunk megszokott fajtáktól. Gyümölcse kerekded, inkább almához hasonló, íze az ananászra, sárgadinnyére, birsre hasonlít, nem igényel utóérlelést, mivel már a fán beérik.

MEGGY	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
DEBRECENI BŐTERMŐ	Június vége-július eleje	nagy 5-6g	Héja sötétpiros, fényes. A gyümölcshús középpiros, festőlevű, kellemesen édes-savas ízű. Kocsánya középhosszú.	ÖNTERMÉKENY	Fája középerős növekedésű, sűrű, sátorozó koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Moníliaéra enyhén érzékeny, a blumeriellás levélfoltosodásra közepesen fogékony. Magasság: 5-8 m
ÉRDI NAGYGYÜMÖLCSŰ	június második hete	nagyméretű (6 g)	Héja sötét kárminpiros, teljes érettségében fekete, tükrösen fényes, közepesen vastag. Húsa kárminpiros, közepkemény, finoman rostos, lédús, édes-savanykás, a megszokott meggyíznél kevésbé savas, zamatos.	'Csengődi', 'Maliga emléke', 'Meteor korai'.	Hajtásrendszer: fája erős növekedésű, kúp alakú, szabályos sudaras, ágcsoportos középsűrű koronát nevel. Koronája idősebb korban is jellegzetesen ritka marad. Termőképesség: korán termőre fordul, hozama a virágzás alatti időjárástól függően bőséges vagy gyenge-közepes. Önmeddő. Magasság: 5-8 m
KÁNTORJÁNOSI REZISZTENS FAJTA	JÚNI VÉGE-JÚLI ELEJE	nagyméretű (5-6 g)	A gyümölcs húsa roppanós és lédús, kellemes textúrájú, amely friss fogyasztásra és feldolgozásra alkalmas.	ÖNTERMÉKENY	Közepes méretű, erős és szilárd törzset növeszt. Egyik legnagyobb előnye a rendkívüli terméshozam. Fiatal korból kezdve képes bőséges gyümölcsöt adni, és ez az évek során csak növekszik, megkapja a megfelelő gondozást. Magasság: 5-8 m
METEOR KORAI	Június eleje (legkorábban érő fajta)	középnagy	A gyümölcshús közepkemény, finoman rostos, kellemesen édes-savanykás, jellegzetes ízű. Magja kicsi.	ÖNTERMÉKENY	Termőképesség: rendszeresen, bőven terem, korán termőre fordul. Virágai korán nyílnak, termékenyülési viszonya ismeretlen. Célszerű más fajtákkal együtt ültetni. Fája erősen fölfelé növekszik, az új hajtásokat az erős szél kitörheti. Koronája viszonylag kicsi. Magasság: 5-8 m

Cseresznye sajmegeg	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
HEDELFIGENI ÓRIÁS	június vége-július eleje	középnagy (5,5-7 g)	Héja fényes, sima, sötétvörös, kezdetben halványabb pirossal, teljesen éretten feketéspirossal pontozott, tetszetős. Húsa sötét kárminpiros, világosabb rostokkal tarkított, félkemény, ropogós, lédús, kellemesen édes-savanykás, harmonikus ízű, fűszeres zamatú. Magvaváló.	Germersdorfi 1, 'Germersdorfi 3', 'Katalin', 'Kavics', 'Solymári gömbölyű', 'Stella', 'Van'.	Hajtásrendszer: fája erőteljes növekedésű, fiatalon felfelé törekvő, nagy, széthajló, jellegzetes gömb koronájú, idős korban a vékony vesszői miatt lecsüngő habitusú. A Germersdorfinál több elágazást nevel, de vesszői vékonyabbak. Kifejlett magasság: 5-8 m Betegségekkel szemben viszonylag jól ellenálló.
STELLA	JÚNIUS VÉGE	nagyméretű (6-9 g)	Héja vékony, sötétbordó, fényes. Húsa feketéspiros, kemény, de nem ropogós, lédús, édes, enyhe savassággal.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája közepes, maj d erős növekedési erélyű, felfelé törekvő, gúla alakú, nyitott koronát nevel. Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. MAGASSÁG: 5-8 M
SUNBURST REZISZTENS FAJTA	június közepe-vége	nagyméretű, 9-10 g	Héja közepesen vastag, előbb élénkpiros, majd mélyvörös, szinte fekete színű. Húsa közepesen kemény, ropogós, lédús, aromás, jó állagú, ízében az édes dominál, de enyhe savasság is érezhető.	ÖNTERMÉKENY -DE TERMÉSE 'Germersdorfi 3', 'Hedelfingeni óriás', 'Linda', 'Stella' - TELEPÍTÉSÉVEL NÖVELHETŐ!	Hajtásrendszer: fája erős növekedésű, koronája kissé szétterülő, felkopaszodásra hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Termőképesség: korán termőre fordul, bőven és megbízhatóan terem. Kifejlett magasság: 5-8 m
SZOMOLYAI FEKETE BIO	június első felében érik (ezért a cseresznyelégység még nem károsítja),	közepes méretű (4-5 g),	Héja közepesen vastag, szívós, sötét lilásbordó, teljesen megérve majdnem fekete színű. A szomolyaiak szerint: "amíg piros, addig zöld", vagyis nevéhez híven feketén az igazi. Húsa félkemény, sötétbordó, lédús, kellemesen édes, különleges zamatú, az egyik legízletesebb fajta. Éretten is sokáig a fán hagyható.	'Bigarreau Burlat', 'Münchebergi', 'Pomázi hosszúszerű', 'Valerij Cskalov'.	Hajtásrendszer: fája középerős növekedésű, sűrű ágrendszerű, a korona kissé szétterülő, kúpos gömb alakú. csipkézett. Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Jó pollenadója a korai fajtáknak. Kifejlett magasság: 5-8 m

KAJSZI	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	Jellemzők	Bővebb leírás
BUDAPEST (VADKAJSZI ALANY)	július végén-augusztus elején	igen nagy (55-58 g),	Megnyúlt, oldalról erősen lapított gömb alakú. Héja közepesen molyhos, világos narancssárga alapszínű, narancsvörössel mosott, élénkpirossal pontozott. Húsa közepesen kemény, aranyssárga, enyhén lédús, éretten nem lisztesedik, magvaváló, jó ízű (a rózsakajsziénál finomabb), kiváló beltartalmi tulajdonságú.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája gyenge növekedésű, mereven felfelé törő, de az ágai a termés súlya alatt széthajlók, csüngők, közepes vagy kis koronája, középsűrű vagy ritka. Termőképesség: jó, korán termőre fordul, kevésbé hajlamos a terméingszagódásra. Későn virágzik és virágrügyeinek fagyállósága is jobb az átlagosnál, ezért a késő tavaszi fagyok kártételének kevésbé van kitéve. Fény és melegigányes. Magassága: 5-6 m
CEGLÉDI ARANY REZISZTENS FAJTA (VADKAJSZI ALANY)	július közepén-végén	közepes méretű (40-45 g)	Gömbölyded. Héja világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon kárminpirossal enyhén díszített. Húsa élénk narancssárga, tömör, szilárd, közepesen lédús, éretten kellemes zamatú. Magvaváló.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája igen erős növekedésű, gyenge elágazódási hajlamú, előbb fölfelé törő, majd kissé szétterülő, félgömb alakú koronát nevel. Virágai későn nyílnak a tavaszi fagyok ritkán károsítják őket. Magassága: 5-6 m
GÖNCI MAGYAR REZISZTENS FAJTA (MIRABOLAN ALANY)	Július közepe	középnagy	A gyümölcshús narancssárga, rostos, lédús, kimondottan édes, aromás ízű. Talán a legkiválóbb zamatú fajta. Magbele édes, kiváló	ÖNTERMÉKENY	Fája középérésű növekedésű, koronája sűrű, félgömb alakú. Korán termőre fordul, nagy termőképességű. Magassága: 5-6 m
GOLDRICH REZISZTENS FAJTA (MIRABOLAN ALANY)	Július eleje - közepe	nagyméretű	A héj világos narancssárga alapszínű, a nap érte oldalon kárminpiros bemosódás előfordulhat. A gyümölcshús lédús és zamatos, ízében erőteljes „kajszi” ízű. A gyümölcsök egyszerre érnek, így nem szükséges több menetes betakarítás.	ÖNTERMÉKENY, de termébiztonsága pollenadó fajták telepítésével növelhető: Hargrand kajszi Aurora kajszi Pincot kajszi	A 'Goldrich' kajszi Amerikából származó, kiváló kajsziarack fajta. A fáját középérésű növekedésű, igen korán termőre fordul, ezt követően rendszeresen és bőven terem. A fajta jellemzője, hogy nagy fényigénye mellett hőigénye alacsonyabb és vízigénye is kisebb a legtöbb kajszi fajtához viszonyítva, így szélsőséges vízellátású területekre is telepíthető. A termése igen nagy méretű, kerekded, oldalról kissé lapított. Magassága: 5-6 m
MAGYAR C.235 (MIRABOLAN ALANY)	Július közepe	közepes (45 g)	Húsa narancssárga, lédús, igen finom.	ÖNTERMÉKENY	A téli és tavaszi lehűlésekre érzékeny, a sarka vírus fertőzésre és rákosodásra közepesen fogékony. A monília hajtáshervadásra és a gnomias levélfoltosságra kevésbé érzékeny. Koronája közepes méretű. Korán termőre fordul, jó termőképességű. Középérésű növekedésű, koronája felfelé törő, közepes méretű, ritka. Későn fordul termőre, de jó termőképességű fajta. Kései virágzása miatt a késő tavaszi fagyokra kevésbé érzékeny. Magassága: 4-6 m

ŐSZIBARACK	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
MARISKA	JÚLIUS KÖZEPE	középnagy, enyhén lapított gömb alakú	Héja kissé molyhos, sárgászöld alapszínű, a gyümölcs felületének nagy részén, de főleg a bibepont körül pirossal csíkozott, esetleg mosott, tetszetős. Húsa zöldesfehér , lédús, jellegzetes őszibarack zamatú, ízletes. Éretten félig magvaváló.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája erős növekedésű, terebélyes koronát nevel. Vesszője piros, virága közepes méretű, világos rózsaszínű, rózsza alakú, levele nagy, lándzsás, kékeszöld. Talajigény: a mélyrétegű, jó víz- és levegőgazdálkodású, tápanyagban gazdag, közepkötött, enyhén meszes vagy semleges kémhatású talaj ideális a számára. Szereti a napos, meleg helyeket. MAGASSÁGA: 3-3,5 M
PADANA	augusztus végén-szeptember elején	nagyméretű (160-240 g)	Héja enyhén molyhos, sárga, melyet 40-70%-ban pirossal mosott vagy márványozott fedőszín borít. Húsa sárga , a mag körül piros, kemény, lédús, harmonikus, igen jó ízvilágú, édes. Magvaváló.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája erős növekedésű, kezdetben felfelé törő, idővel terebélyesedő, nagy koronát nevel. Levele középnagy, széles lándzsás, virága rózsza alakú. MAGASSÁGA: 3-3,5 M
REDHAVEN	Július vége	közepes-nagy	Héja sárga, csíkozott, piros fedőszínnel. Jó ízű, élénk sárga húsú gyümölcssei magvaválóak, a mag körül piros színű a terméshús.	ÖNTERMÉKENY	Szétterülő koronát nevel. Kiváló a fagyűrő képessége, és a lisztharmatra, vagy a tafrinás levélfodrosodásra sem túl érzékeny. Fagyűrő. Nagyon bőtermő, jó ízű gyümölcsöt érlelő, és a környezeti tényezőkhöz nagyszerűen alkalmazkodik. MAGASSÁGA: 3-3,5 M
SIMFONIA	augusztus közepén érik	igen nagyméretű (170-210 g)	Héja finoman molyhos, a sárga-narancssárga alapszín mintegy 70-80%-ban lilásvörös fedőszínnel borított. Húsa kemény, sárga, lédús, nagyon ízletes, édes. Magvaváló.	ÖNTERMÉKENY	Hajtásrendszer: fája nagyon erős növekedésű, szétterülő koronát nevel. Levele nagy, világoszöld, keskeny, finoman fogazott szélű. Virága rózsaszín, középidőben nyílik. Fény- és hőigény: nagy, szereti a napos, meleg helyeket, ezért gondosan válasszuk meg, hová ültetjük MAGASSÁGA: 3-3,5 M

SZILVA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
ALTHANN RINGLÓ (MIRABOLAN ALANY)	augusztus közepe	nagy, 40-45 gramm	A gyümölcshús narancssárga, nagyon leves, édes, enyhén savanykás, de a cukor-sav arány igencsak harmonikus. Magvaváló fajta, ezért könnyű a feldolgozása.	DEBRECENI MUSKOTÁLY, AGENI	Fája erős növekedésű, fiatalon felfelé törő ágrendszerű, majd a termőre fordulás után a termés súlya alatt koronája szétterül. Rendszeresen és bőven terem, de önmeddő, ezért a terméskötődéshez porzópárra van szükség. Hőigénye közepes, fagyűrője jó. MAGASSÁG: 3-3,5 M
BESZTERCEI NM22 (MIRABOLAN ALANY)	Szeptember eleje-közepe	apró 18-22 g	A terméshéj sötétkék és hamvas. Húsa kemény, sárga, teljesen magvaváló . Magas cukor (15-16%) és savtartalma miatt kiváló ízű és széles feldolgozási lehetőségekkel bíró szilvafajta.	ÖNTERMÉKENY	Az egyik legnagyobb arányban alkalmazott házikerti fajta. Közepes növekedési eréllyel rendelkezik, nagy, feltörő, kúp alakú koronát nevel. Későn nyíló virágai nagymértékben öntermékenyülők. Mivel későn virágzik, a késő tavaszi fagykároktól nem kell tartani ennél a fajtánál. Nagyon jó télálló. Későn fordul termőre. Bőtermő, de alternanciára hajlamos, ezért időnként érdemes termést ritkítani. Az egyik legjobb szilvalekvár- és pálinkafőzéshez. MAG.: 2,5-3,5 M
DEBRECENI MUSKOTÁLY konténeres fa!!! (MIRABOLAN ALANY)	SZEPTEMBER KÖZEPE	középnagy (30-35 g)	Héja sötétlila, hamvas, a gyümölcshús aranysárga, kemény, lédús, éretten intenzív muskotályos illata és zamata van. Magvaváló .	Althann ringló, Ageni, President, Ruth Gerstetter, Sermina, Olasz kék.	Növekedés, hajtásrendszer: Télálló, sűrű koronát nevel. Magasság: 3-3,5 m
NEMTUDOM P3 BIO (MIRABOLAN ALANY)	augusztus vége-szeptember eleje	kisebb méretűek, kökényszilvára emlékeztetők.	A héj vékony, hamvas és sötét kék színű. A hús világossárga, lédús és enyhén rostos, kellemes szilvaízű, inkább édes mint savas íztartományban mozog.	ÖNTERMÉKENY	Fája erős növekedésű, fiatal korban felfelé törekvő. Korán termőre forduló, igénytelen fajta, betegségek ritkán támadják meg. A telepítését üde talajú, ártéri területekre is javasolják. Rendszeresen és bőven terem évről-évre függetlenül.

Mandula vadószí al.	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
TÉTÉNYI REKORD (vadószí alany) KONTÉNERES!	Szeptember vége-Október eleje	közepesen nagy	Világossárga héj, íze fűszeres	TÉTÉNYI BŐTERMŐ	Erőteljes növekedésű, bőtermő. Magasság: 6-7 m
SUPERNOVA (vadószí alany)	SZEPTEMBER ELEJE	közepesen nagy (40mm)	A gyümölcs félkemény, könnyen törhető, színe világosbarna, a bél kiváló ízű. Alkalmas friss fogyasztásra, de szárítva alkalmas sósan elfogyasztva, vagy édességekhez felhasználva is kiváló.	ÖNTERMÉKENY	Virágzása középkései, március második felében nyílik, így kevésbé áll fenn a késő tavaszi fagyok okozta virág elfagyás. Fája középerős növekedési erélyű. Rendszeresen és bőven termő, megbízható mandulafajta. Betegségekkel szemben jól ellenálló, kevés törődést igénylő fajta. Magasság: 6-7 m

BIRSALMA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
BERECZKI BŐTERMŐ (BA 29 alany)	Szeptember végén-, október elején	kifejezetten nagy (300-400 g)	A termés aromás, lédús, kemény húsú, fűszeres és illatos. Januárig kiválóan tárolható. Az egyik legizletesebb fajta.	'Konstantinápolyi birs'	Fája középerős növekedésű. Rendszeresen és bőven terem (ahogy neve is mutatja), megbízható fajta. Szeptember végén-, október elején érik. Terméshéja aransárga, erősen molyhos, körte alakú, közepesen vastag. A termés kifejezetten nagy (300-400 g). A legizletesebb és legillatosabb fajták között van. Alkalmas friss fogyasztásra, konyhai feldolgozásra, befőttnek, sajtnak, ivólének és pálinkának is. Tárolásra is kiváló. MAGASSÁGA: 2-3,5 M Nagy fényigényű növény.
MEZŐTÚRI (BA 29 alany)	Szeptember végén - október elején szedhető	közepes méretű	Gyümölcse alma alakú, kerekded, mely közepes mérettel rendelkezik.. Éretten héja sárgászöld.	ÖNTERMÉKENY, de a 'Bereczki' birssal jól termékenyítik	Fája erős növekedésű, felfelé törő koronahabitusú. Gyümölcse alma alakú, kerekded, mely közepes mérettel rendelkezik. Decemberig tárolható. Kiemelkedően magas a hozama a korona térfogategységére számítva. Rostos ivóléként való felhasználásra a leginkább alkalmas fajta, ugyanis ebből készíthető a legzamatosabb és legillatosabb frissítő gyümölcslé.

NASPOLYA	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
HOLLAND ÓRIÁS (BA 29 alany)	november	A gyümölcsök nagy méretűek, ezért az óriás naspolyák közé sorolják a fajtát.	A gyümölcshús enyhén leveses, kellemesen édes és savas ízű. A termés lapított gömb alakú, a héj világosbarna, a nap érte oldalon piros pír megjelenhet rajta.	ÖNTERMÉKENY	A koronája középnagy, szétterülő, terméshozama pedig gyenge vagy közepes, melyet a termésméretben pótol. A gyümölcsök nagy méretűek, ezért az óriás naspolyák közé sorolják a fajtát. A termés lapított gömb alakú, a héj világosbarna, a nap érte oldalon piros pír megjelenhet rajta. A termésérés ideje ősz végén van, ekkor a fáról szedett terméseket sötét helyen 4-6 hét alatt lehet utóérlelni, vagy az első erősebb fagyokig a fán is lehet hagyni néhány termést.

KÖKÉNY	Termés érési ideje	Termés nagysága	Gyümölcshús	POLLENADÓK	Bővebb leírás
ZEMPLÉNI KÖKÉNY (mirabolán alany)	szeptember közepétől/végétől	gömbölyded, enyhén lapított, kb. 2-2,5 cm átmérőjű, 7-9 g tömegű,	Hamvas, kékeslila, viszonylag alacsony savtartalmú, fagyhatás nélkül is kellemes ízű termése szeptember közepétől/végétől érik. Számos ásványi anyagot (kalcium, kálium, magnézium, foszfor, vas stb.), vitamint (A, B1-, B2-, B6, C, E), cseranyagokat, antioxidáns vegyületeket stb. tartalmaz, melyek jótékonyan hatnak szervezetünkre.	ÖNTERMÉKENY	kb. 1,8-2,2 m magas , erőteljes, felfelé törő növekedésű, ágai alig tövisesek. Lombozatát szórt állású, 2-5 cm hosszú, széles lándzsa vagy hosszúkás elliptikus, csipkésen fűrészes szélű, tompa vagy röviden kihegyezett csúcsú, élénkzöld levelek alkotják. Virág: lombfakadás előtt, március-áprilisban nagy tömegben, egymáshoz sűrűn elhelyezkedve nyílnak 1-1,5 cm átmérőjű, 5 szirmú, kb. 20 porzószerű, fehér, nektárban gazdag virágai. Megszárítva, teaként fogyasztva vértisztító, vizelethajtó, magas vérnyomást csökkentő hatásúak. Fényigény: közepes, napos vagy félárnyékos